

DOCTEUR ALAIN BITTON

SPÉCIALISTE UROLOGUE FMH
CHIRURGIE DES VOIES URINAIRES

ANCIEN CHEF DE CLINIQUE - INSELSPITAL, BERNE
ANCIEN CHEF DE CLINIQUE - BRISTOL UROLOGICAL INSTITUTE
FORMER CLINICAL FELLOW IN URO-ONCOLOGY (BUI)
MEMBER OF THE BRITISH ASSOCIATION OF UROLOGICAL SURGEONS
FELLOW OF THE EUROPEAN BOARD OF UROLOGY
ACTIVE MEMBER OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR SEXUAL MEDICINE

Avant la circoncision :

- Dernier biberon ou tétée 1 heure avant la circoncision
- Préparer le nécessaire de toilette, des couches et des lingettes pour change au besoin
- Apportez la médication et les pansements prescrits
- Bouteille de vin doux ou jus de raisin et verre de kidouch
- Feuilles de roses séchées, clous de girofle ou autre « bessamim » (Minhag Séfarad)
- Coussin ferme pour poser le bébé
- Prévoir deux talith (papa et sandak)
- Préparer un biberon de lait pour après la brit (si complément ou pas de tété)
- Prévoir un habit 2 pièces de rechange pour après la brit : le plus simple est toujours le mieux !

Après la circoncision :

Mazal Tov ! Votre garçon vient d'être circoncis B"H. Il a besoin durant les heures suivant sa circoncision de calme et de repos, tout comme sa maman. Quelques minutes après la brit, le mohel va contrôler le pansement et changer la compresse superficielle. Le pansement au contact de la brit restera en place et ne sera enlevé que par le mohel. Pendant tout le temps, les changes se font tout à fait normalement : nettoyage des fesses à l'eau et au savon doux, lait de toilette habituel.

Pour les soins voici la marche à suivre :

- ✓ Nettoyez-vous les mains avec de l'eau et du savon
- ✓ Séchez les mains et appliquez une désinfection à l'alcool ou du stérilium gel

Le premier bain ? Vers le troisième jour mais dans tous les cas c'est le mohel qui vous précisera quand.

Quelques Conseils pratiques :

1. Le jour de la Brit Mila, il faut donner à votre bébé une mesure de sirop ou un suppositoire (entre 40 et 60 mg en fonction du poids) de PANADOL, à lui renouveler toutes les 4 à 6 heures.
3. Avant chaque change :
 - préparer la poudre Stop HEMO et ne pas hésiter à saupoudrer en cas de saignement (il est normal que la compresse superficielle soit imbibée et rosée même s'il n'y a pas de saignement actif). Changer la compresse superficielle en appliquant un petit cercle de pommade fucidine sur une nouvelle compresse stérile comme vous l'a montré le Mohel.
4. Au change (généralement après le biberon ou l'allaitement) :
 - A chaque change vous pouvez nettoyer autour de la circoncision mais pas sur le pansement
Retirer doucement la compresse du dessus (au besoin imbiber avec de l'huile d'amande douce).
Verser quelques gouttes d'huile d'amande douce sur la cicatrice et le pansement.
Au besoin saupoudrer avec du stop hémo en poudre
Etre accompagné d'une personne majeure pour qu'elle lui tienne les petites jambes,
 - profiter également de bien nettoyer le bébé à l'eau (ne pas appliquer de crème) sous les testicules, aux fesses.

Pour les changements et l'endormissement évitez si possible de mettre le bébé sur le ventre ou même sur vos genoux pendant quelques jours après la circoncision.

Remarque importante :

Si l'enfant n'est pas à l'allaitement, la maman ne devra pas changer de marque de lait maternisé sans avis du pédiatre dans les 48 heures précédant la circoncision. En effet, cela pourrait entraîner des problèmes gastriques chez le bébé le jour de la circoncision.